

## **Campaña contra el Virus del Papiloma Humano**

Escrito por Redacion

Jueves, 23 de Agosto de 2012 09:30 -

---



La Gobernadora Aury Guerrero Bowie este viernes estará haciendo oficial el lanzamiento de la campaña de vacunación del VPH, o virus del Papiloma Humano, dirigida en su primera fase a niñas escolarizadas de cuarto grado de básica primaria, de nueve años de edad en adelante.

Luego de la introducción de la vacuna según parámetros de la Organización Mundial de Salud (OMS), la secretaria de Salud Departamental enfatizó en los padres de familia, cuidadores y docentes, en donde se les explicó la importancia para la salud de las niñas, debido a que en San Andrés y Providencia el cáncer de cuello uterino tiene una incidencia de 16.7% y una mortalidad anual promedio de siete mujeres.

Como parte de la estrategia nacional para reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello uterino, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y en alianzas con otros organismos de salud, han decidido incluir en el esquema único nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), cuyo esquema completo contempla la aplicación de tres dosis.

La vacuna se aplica en el brazo, generalmente se puede presentar reacciones de tipo local en el sitio de aplicación de la vacuna como enrojecimiento, inflamación y dolor, por lo que las niñas podrán continuar su jornada escolar de manera regular.

### **Calendario**

## **Campaña contra el Virus del Papiloma Humano**

Escrito por Redacion

Jueves, 23 de Agosto de 2012 09:30 -

---

En el país, se aplicará de manera gratuita la vacuna tetravalente, es decir, la que contiene los virus 6, 11, 16 y 18; a las niñas escolarizadas de cuarto grado de básica primaria, de 9 años y más de edad, para lo cual los vacunadores se desplazarán a las instituciones educativas previa concertación de cronograma con las directivas.

La jornada de vacunación inicia en agosto, con actos protocolarios en cada municipio.

El cáncer de cuello uterino, puede aparecer a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 35 y 55 años. Las causas en su gran mayoría son desconocidas, pero hoy en día se sabe que existe un virus, que puede producir esta enfermedad y se llama el Virus del Papiloma Humano; la infección está ampliamente difundida en personas menores de 25 años, por eso se recomienda vacunar a las niñas a la edad más temprana posible, a los 9 o 10 años de edad.

Las personas con mayor riesgo de infectarse son los jóvenes porque desconocen lo que es capaz de producir este virus. El tiempo entre la infección inicial por VPH y el desarrollo de cáncer cervical promedia los 20 años. En Colombia, el cáncer de cuello uterino ocupa en frecuencia el primer lugar, seguido del cáncer de seno y el cáncer de estómago.